



Pupile pod
Ochroną



Poradnik

opiekuna



Jak przewieźć psa lub kota do lecznicy, czyli pupil na badaniach

Przewiezienie psa lub kota do lekarza
nie zawsze jest proste!

Sprawdź, co zrobić, by ta podróż była bezpieczna
i jak najmniej stresująca dla Twojego pupila.

PODRÓŻ DO LEKARZA WETERYNARII – CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?

Zawiezenie kota na wizytę do lecznicy bywa nie lada wyzwaniem! Mruczek, który nie miał kontaktu ze światem zewnętrznym może panikować, bronić się przed włożeniem do transportera, głośno miauczeć podczas całej podróży, a nawet uciec i już nie dać się złapać. Z podobnymi problemami mierzy się także wielu opiekunów psów, które wyjątkowo źle znoszą kontakt z lekarzem weterynarii. Na szczęście istnieje kilka sposobów, dzięki którym można sprawić, że taka podróż będzie mniej stresująca dla czworonoga, a sam pupil na badaniach będzie spokojniejszy.





ZACHOWAJ SPOKÓJ

Niektórzy opiekunowie już na samą myśl o zabraniu pupila do lekarza weterynarii odczuwają silny stres. Niestety każdy zwierzak to wyczuwa i sam zaczyna się niepokoić! To właśnie zdenerwowanie opiekuna sprawia, że psy doskonale odróżniają wyjście na spacer od wizyty w lecznicy i wcale nie spieszą się do drzwi, a koty nagle znikają w ciasnym kącie i nie reagują na nawoływania. W przypadku psów warto zaplanować krótki spacer przed wizytą i to właśnie na nim skupić myśli podczas przygotowań do wyjścia. Samo wyjście warto też zaplanować z dużym zapasem czasu. Pozwoli to na zmniejszenie zamieszania i spokojne przygotowanie psa do podróży czy zaproszenie mruczka do transportera. Dopiero po „pochwyceniu” zwierzaka należy wyjąć z szuflady książeczkę pupila i przygotować pozostałe rzeczy niezbędne podczas wizyty – taka kolejność uniemożliwi czworonogowi ukrycie się w domu, gdy zorientuje się, jaki jest cel podróży. Dzięki temu będzie można zaoszczędzić nie tylko czas, ale także nerwy związane z próbą złapania przestraszonego czworonoga.



ZMNIJSZ RYZYKO UCIECZKI

Na ucieczkę podczas podróży do lecznicy narażone są szczególnie koty niewychodzące. Kontakt z nieznanym otoczeniem często wywołuje u takiego zwierzaka panikę skłaniającą do natychmiastowej ucieczki i sprawiającą, że złapanie mruczka będzie graniczyło z cudem. Dlatego niedopuszczalne jest zabieranie kota do lekarza weterynarii na rękach, smyczy lub w otwartym koszyku. Mruczek musi być bezwzględnie umieszczony w solidnym transporterze. Opiekun powinien upewnić się, że transporter jest dobrze zamknięty, a kot nie ma możliwości otworzenia go od wewnątrz. By ograniczyć stres zwierzaka, warto przykryć transporter kocem, który zasłoni mu widok. Niestety nie tylko koty mogą uciec podczas podróży. Zagrożenie to dotyczy także psów – szczególnie tych, które nie czują się pewnie w obcych miejscach, reagują paniką na widok wejścia do lecznicy czy czują się bardzo źle z powodu choroby. Każdego czworonoga należy więc prowadzić na smyczy i w dobrze dopasowanej obroży lub szelkach. Mniejsze psiaki można umieścić w transporterze, który podobnie jak w przypadku kotów, musi być dobrze zamknięty.



BUDUJ POZYTYWNE SKOJARZENIA

Niechęć i strach pupila można znacząco zmniejszyć, budując pozytywne skojarzenia z przygotowaniami do wizyty. Mruczka warto nauczyć wchodzenia na komendę do transportera, pełniącego na co dzień funkcję legowiska, a psiaka można zabierać na przyjemne spacery w okolicę lecznicy lub na przejażdżki samochodem do ciekawego parku. Podczas samej wizyty warto nagradzać zwierzaka za pomocą pochwał i przysmaków. Można też poprosić lekarza, by podał czworonogowi kilka smacznych kąsków po zakończonym badaniu.

ZAPYTAJ SPECJALISTĘ O ŚRODKI USPOKAJAJĄCE

W przypadku psów lub kotów, które wyjątkowo źle znoszą podróż i wizyty u lekarza weterynarii, pomocne mogą okazać się suplementy łagodzące stres. Większość takich suplementów bazuje na naturalnych substancjach, które uspokoją czworonoga, ale nie wywołają u niego otumanienia ani senności. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy z takich preparatów można stosować przed pobieraniem krwi, zabiegami czy u zwierząt cierpiących na choroby przewlekłe. Dlatego przed podaniem psu lub kotu czegoś na uspokojenie należy zawsze skonsultować się z lekarzem weterynarii.




Badania profilaktyczne psa i kota

..... Dlaczego regularne kontrole zdrowia
są takie ważne?

..... Jak często należy zabierać pupila
na przegląd zdrowia do lekarza
weterynarii?

DLACZEGO BADANIA PROFILAKTYCZNE SĄ TAKIE WAŻNE?

Niektóre choroby występujące u psów i kotów będą objawiać się w wyraźny sposób – zwierzak może dostać biegunki, stracić apetyt, nie mieć ochoty do zabawy. Jednak nie zawsze tak jest! Część dolegliwości może przebiegać bezobjawowo lub wywoływać jedynie niewielki dyskomfort, którego zwierzak nie będzie okazywał opiekunowi. W takim przypadku może zdarzyć się, że widoczne objawy pojawią się dopiero wtedy, gdy choroba przybierze już zaawansowane stadium. Do problemów zdrowotnych, mogących rozwijać się bez wiedzy opiekuna należą między innymi:



- przewlekła niewydolność nerek,
- kamica moczowa,
- niedoczynność lub nadczynność tarczycy,
- cukrzyca,
- choroby wątroby,
- kardiomiopatie,
- różnego rodzaju nowotwory.

Chory zwierzak będzie oczywiście odczuwał, że z jego organizmem dzieje się coś złego – może czuć szczypanie podczas oddawania moczu, klucie w boku po jedzeniu czy ból w klatce piersiowej przy większym

wdechu powietrza. Niestety nie jest w stanie ani o tym opowiedzieć, ani okazać tego opiekunowi. Brak szybkiego wprowadzenia leczenia może poskutkować tym, że podstępna choroba dokona poważnych, nieodwracalnych zniszczeń w organizmie czworonoga, na przykład doprowadzając do całkowitego zniszczenia nerki czy przerzutów nowotworów. Jedyną możliwością, by zapobiec takiej sytuacji, jest regularne wykonywanie badań profilaktycznych psom i kotom. Co powinien objąć taki przegląd zdrowia i jak często należy go wykonywać?

CO POWINNY OBEJMOWAĆ BADANIA PROFILAKTYCZNE PSA I KOTA?

Do podstawowych badań pozwalających sprawdzić, w jakim stanie są narządy wewnętrzne zwierzaka, należą badania krwi i moczu. Ich wyniki poinformują specjalistę, czy nie doszło do osłabienia pracy nerek, wątroby, trzustki i jelit. Ewentualne odchylenia parametrów od normy będą wskazaniem do dalszej diagnostyki, która wykaże przyczynę problemów.

Podstawowe badania krwi i moczu nie są jednak wystarczające do upewnienia się, że czworonóg jest całkowicie zdrowy – nie wykryją w 100% wszystkich chorób. Dlatego profilaktykę warto uzupełnić o bardziej precyzyjną diagnostykę, szczególnie w przypadku psów i kotów w podeszłym wieku. Wśród badań profilaktycznych, które może zalecić lekarz weterynarii, znajduje się echo serca, badanie USG jamy brzusznej oraz badanie krwi rozszerzone o dodatkowe parametry.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH U PSA I KOTA

To, jak często należy zabierać pupila na przegląd zdrowia, zależy od kilku czynników. Zalecana częstotliwość podstawowych badań krwi i moczu wynikać będzie przede wszystkim z wieku czworonoga:



psy i koty rosnące

– raz na pół roku (badania pozwolą wykryć ewentualne choroby wrodzone i wady rozwojowe);



psy i koty dorosłe

– raz na rok (u tych zwierząt ryzyko chorób przewlekłych jest stosunkowo niskie);




psy i koty powyżej 7 roku życia

– raz na pół roku (starzejący się organizm staje się podatny na problemy zdrowotne).

Oczywiście zalecenia te dotyczą wyłącznie zwierząt, u których nie występują żadne niepokojące objawy. Wszelkie zmiany w zachowaniu powinny być od razu konsultowane z lekarzem weterynarii – nawet, jeśli pojawią się zaledwie tydzień po przeglądzie zdrowia. U starszych psów i kotów, oprócz profilaktycznych badań krwi i moczu, należy także wykonywać szersze badania, które obejmą USG, dodatkowe parametry krwi (szczególnie dotyczące tarczycy) oraz echo serca. Takie badania nie muszą być jednak wykonywane co roku, a ich częstotliwość ustala lekarz weterynarii.

ILE KOSZTUJĄ BADANIA PROFILAKTYCZNE ZWIERZĄT?

Cena podstawowego badania krwi i moczu u psa i kota nie jest wysoka – koszt zamyka się zazwyczaj w 150 zł. Dodatkowe badania mogą natomiast sięgać kilkuset złotych. Trzeba jednak pamiętać, że późne wykrycie nowotworu czy niewydolności nerek znacząco zmniejszy szanse zwierzaka na powrót do zdrowia, a koszty leczenia choroby w zaawansowanym stadium będą znacznie wyższe, niż badania profilaktyczne.





Robaki u psa - jak się pozbyć pasożytów?

Częstym problemem, który może zagrozić zdrowiu naszego pupila, są pasożyty wewnętrzne. Objawy są uciążliwe zarówno dla psa, jak i opiekuna.

Jakie robaki u psa występują najczęściej i jak się ich pozbyć?

JAKIE GATUNKI ROBAKÓW MOGĄ ZAATAKOWAĆ PSA?

Pasożyty wewnętrzne, atakujące psy, można podzielić na dwie główne grupy, których przedstawicielami są tasiemce i nicienie. Mogą one wyrządzić w organizmie psa wiele szkód, a także zaszkodzić ludziom, w szczególności dzieciom.



TASIEMCE U PSA

Najczęstszym gatunkiem tasiemca u psów jest tasiemiec psi. Do zarażenia dochodzi najczęściej poprzez połknięcie pchły, która jest żywicielem pośrednim tego pasożyta. Miejsce bytowania tasiemca psiego to jelito cienkie, gdzie przyczepia się do błony śluzowej, uszkadza ją, a w konsekwencji utrudnia wchłanianie substancji odżywczych. Pasożyt ten w jelicie psa może osiągnąć nawet do 80 cm długości. Dlatego w przypadku ciężkiego zarobaczenia, może dojść do zaczerwienienia światła jelita, a w skrajnych przypadkach do śmierci zwierzęcia.



NICIENIE U PSA

Wśród nicieni, które najczęściej występują u psów wyróżniamy glistę psią, włosogłówkę i tęgoryjca psiego. Przyczyną zarażenia tymi pasożytami jest zjedzenie jaj lub larw, znajdujących się w zakażonym środowisku. Dorosłe osobniki nicieni bytują w jelicie cienkim, ale larwy przemieszczają się wraz z krwią do różnych narządów wewnętrznych psa, między innymi do wątroby, serca czy też płuc, gdzie są wykrztuszane, a następnie ponownie połykane. W ten sposób pasożyty krążą po całym organizmie, powodując złe samopoczucie.

JAKIE SĄ OBJAWY ZAROBACZENIA U PSA?

Najczęściej wskazywanym objawem pasożytów w organizmie psa jest ich obecność w kale. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze tak jest. Żerujące w jelitach zwierzęcia robaki mogą przez dłuższy czas nie dawać żadnych objawów, widocznych gołym okiem. Rozprzestrzeniająca się inwazja pasożytów dopiero z czasem będzie powodować stopniowe wyniszczanie organizmu psa. Objawia się to utratą masy ciała, apatią, osłabieniem sierści, nawracającymi biegunkami, również z krwią, wymiotami i bólem brzucha. Robaki w odchodach psa pojawiają się dopiero w przypadku poważnego zarobaczenia i nie zawsze są dla opiekunów „oczywiste”. Mogą przypominać na przykład ziarenka ryżu, czy też kawałeczki makaronu. Czasami całe pasożyty lub ich człony mogą być widoczne w wymiocinach.

CZY CZŁOWIEK MOŻE ZARAZIĆ SIĘ ROBAKAMI OD PSA?

Na to pytanie odpowiedź jest prosta: tak, człowiek może zarazić się pasożytami wewnętrznymi, które występują u czworonoga. Jednym najczęstszych z przykładów chorób odzwierzęcych jest toksokaroza, na którą narażone są przede wszystkim dzieci. Do zarażenia może dojść poprzez przypadkowe połknięcie jaj glisty. Mogą się one znajdować w miejscach zanieczyszczonych odchodami zwierząt, na przykład w piaskownicy, w której bawią się dzieci. Zarażenie się tasiemcem psim wśród ludzi jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Spowodowane jest to specyficzną drogą zakażenia: połknięciem pchły, będącej żywicielem pośrednim.

JAK POZBYĆ SIĘ ROBAKÓW U PSA?

Regularne podawanie tabletek odrobaczających to najlepszy sposób na pozbycie się robaków u psa. Aby działanie było skuteczne, warto stosować środki o najszerszym spektrum działania, które jednocześnie zwalczają zarówno pasożyty z grupy nicieni, jak i tasiemce. Takie tabletki dla psów zawierają zazwyczaj połączenie kilku substancji czynnych: prazykwantel, embonian pyrantelu i fenbendazol. Lekiem, który zawiera te 3 substancje czynne są tabletki odrobaczające dla psa InPar.



JAK CZĘSTO NALEŻY ODROBACZAĆ PSA?



Standardowo, dorosłe psy, które mają kontakt z odchodami innych zwierząt, na przykład podczas spacerów, należy odrobaczać regularnie, co 3 miesiące. Istnieją również przypadki, w których powinno się robić to częściej, na przykład w przypadku psów w schroniskach i suk karmiących. Przebieg leczenia w takich sytuacjach każdorazowo ustala wtedy lekarz weterynarii.



Pierwsze odrobaczanie szczeniąt najlepiej jest przeprowadzić między 2 a 4 tygodniem życia, a następnie regularnie podawać preparat odrobaczający co miesiąc, aż do 6 miesiąca życia malucha.



W przypadku silnego zakażenia pasożytami wewnętrznymi może być konieczne przeprowadzenie dłuższej kuracji odrobaczającej, niż jednorazowe podanie preparatu. Sposób i przebieg leczenia ustala lekarz weterynarii na podstawie wyników badań i stanu zdrowia psa.



ODROBACZANIE TO WAŻNA SPRAWA!

Poznaj InPar – tabletki
odrobaczające dla psów



Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Szczegółowe informacje o leku na: www.pupilepodochrona.pl



Sezon na kleszcze - Pamiętaj o ochronie pupila!

Gdy mroźna zima zaczyna odpuszczać, słońce wychodzi zza chmur i robi się coraz cieplej, nie tylko ludzie mają lepsze humory! Rozpoczyna się wtedy sezon na kleszcze, które po zimowym wyciszeniu poszukują pożywienia tak samo u ludzi, jak i psów i kotów.

KLESZCZE – MAŁE, WIELKIE ZAGROŻENIE

Wiosenne słońce sprzyja dobremu samopoczuciu i różnego rodzaju aktywnościom na świeżym powietrzu. Zaczynamy więc czas spędzać poza domem, również ze zwierzakami. Nie możemy jednak zapominać o czyhającym niebezpieczeństwie – niewielkich pasożytach, które kryją się nie tylko w lasach i parkach, ale także w przydomowych ogródkach oraz miejskich trawnikach. Mowa oczywiście o kleszczach! Jak nie zostać ich ofiarą i uchronić przed tym także pupila? W tym artykule dowiesz się, kiedy kleszcze są aktywne, gdzie można je spotkać i jak sobie z nimi poradzić.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ SEZON NA KLESZCZE?

Przyjęło się, że o wzmożonej aktywności kleszczy zaczynamy mówić na wiosnę, kiedy temperatury zaczynają być wyższe, a pogoda bardziej słoneczna. Czy w związku z tym, zimą nie ma zagrożenia atakiem tego pasożyta? To zależy. Przy bardzo niskich temperaturach kleszcze zapadają w coś na kształt „zimowego snu”. Chowają się w ściółce, a ich aktywność się zmniejsza, aby mogły przetrwać trudny czas. Wystarczy jednak, aby temperatura wzrosła do około 5-7 stopni Celsjusza, aby kleszcze zaczęły być aktywne i wyruszyły na poszukiwanie ofiary. Wiosną pogoda zaczyna być dla nas łaskawsza, a średnia dobowa temperatura nie spada poniżej tej „granicznej” wartości wyznaczającej aktywność tych pasożytów. Dlatego też tę porę roku uważa się za początek sezonu wzmożonej aktywności kleszczy.

Pamiętaj, kleszcze są aktywne cały rok!

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ



Szczyt aktywności
kleszczy

Szczyt aktywności
kleszczy



GDZIE MOŻNA SPOTKAĆ KLESZCZE?

Naturalne środowisko, w którym żyją kleszcze to nie tylko lasy, jak przyjęło się mówić. Na te pasożyty można natknąć się zarówno na wsi, jak i w mieście. Potrafią chować się w ogródkach, na polach, w parkach i miejskich trawnikach. Kleszcze nie „skaczą” także na swoją ofiarę z drzew i nie żyją tylko w wysokich zaroślach. Zazwyczaj zlokalizowane są znacznie niżej, w trawie, gdzie polują na swoją ofiarę, lokalizując ją na podstawie ciepłoty ciała, zapachu i wydychanego dwutlenku węgla.



UGRYZIENIE KLESZCZA

Pasożyty te najczęściej wybierają na ukąszenie miejsca na ciele, które są pokryte cienką skórą, dobrze ukrwione i wilgotne. Dlatego ich „ulubione” miejsca to między innymi kark, pachy, dół podkolanowy czy też uda. Ugryzienie kleszcza jest niewyczuwalne, ponieważ te podstępne pasożyty potrafią znieczulić miejsce wkłucia. Możemy przez dłuższy czas nie wiedzieć, że my lub nasze zwierzaki, jesteśmy żywicielami pasożyta. Samo ugryzienie nie jest groźne, ale niebezpieczne są choroby, którymi mogą nas zarazić kleszcze.

JAK OCHRONIĆ PUPILĘ PRZED KLESZCZAMI?

Jeśli chodzi o choroby odkleszczowe, zdecydowanie lepiej zapobiegać niż leczyć! Profilaktyka powinna dotyczyć zarówno nas samych, jak i naszych zwierząt. Istnieje wiele środków przeciwko kleszczom dla psów i kotów, które należy stosować regularnie, aby nie dopuścić do zarażenia chorobami. Wśród nich warto wyróżnić linię leków weterynaryjnych Fiprex. Są to krople do stosowania na skórę w formie spot-on oraz w postaci spray'u. Produkt zwalcza nie tylko kleszcze, ale także pchły.

Mimo odpowiedniego zabezpieczenia, warto po każdym wiosennym spacerze dokładnie obejrzeć skórę pupila, szczególnie najbardziej narażone okolice, jak wnętrze uszu, pachwiny czy też grzbiet. Jeśli zauważysz kleszcza u swojego psa lub kota możesz skonsultować się z lekarzem weterynarii, który sprawdzi możliwość zakażenia chorobami i wskaże odpowiedni sposób postępowania.

FIPReX®

Bezłitosny dla pcheł i kleszczy!



**Zapytaj o Fiprex w lecznicach
weterynaryjnych i sklepach zoologicznych.**

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Szczegółowe informacje o lekach na: www.fiprex.pl

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Fiprex L, 300 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów. **SUBSTANCJA CZYNNNA:** Jedna tubka 4 ml zawiera: substancja czynna: Fipronil 300 mg. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Roztwór do nakrapiania. Roztwór o barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej. **WSKAZANIA:** Zwalczanie inwazji pcheł (*Ctenocephalides* spp.), kleszczy (*Ixodes* spp.) i wszy (*Linognathus* spp.) u psów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni. Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), po uprzednim postawieniu diagnozy przez lekarza weterynarii. ChPL: 03.04.2024 r.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Fiprex DUO 50 mg + 60 mg roztwór do nakrapiania dla kotów i frotek. **SUBSTANCJA CZYNNNA:** Każda 0,5 ml pipetka zawiera: substancje czynne: Fipronil 50,00 mg, (S)-Metopren 60,00 mg. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Roztwór do nakrapiania. Klarowny zielonkawo-żółty roztwór. **WSKAZANIA:** U kotów: Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i (lub) wszołami. Eliminacja pcheł (*Ctenocephalides* spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 6 tygodni po zabiegu. Eliminacja kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Działanie roztoczebójcze produktu utrzymuje się do 2 tygodni po podaniu (jak wykazały dane doświadczalne). Eliminacja wszołów (*Felicola subrostratus*). Produkt może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), o ile zostało ono wcześniej rozpoznane przez lekarza weterynarii. U frotek: Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami. Eliminacja pcheł (*Ctenocephalides* spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Eliminacja kleszczy (*Ixodes ricinus*). Działanie roztoczebójcze produktu utrzymuje się przez 4 tygodnie po podaniu (jak wykazały dane doświadczalne). ChPL: 08.01.2022 r.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: InPar 50/144/200 mg tabletki dla psów. **SUBSTANCJA CZYNNNA:** Jedna tabletka zawiera substancje czynne: Prazykwantel 50 mg, Embonian pyrantelu 144 mg, Fenbendazol 200 mg. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Żółta lub żółtoszara, okrągła tabletka z linią podziału. **WSKAZANIA:** Leczenie u psów mieszanych inwazji dorosłych postaci nicieni i tasiemców następujących gatunków: Glisty: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (postacie dorosłe i niedojrzałe); Tęgoryjce: *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala* (postacie dorosłe); Włosogłówki: *Trichuris vulpis* (postacie dorosłe); Tasiemce: *Dipylidium caninum*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis* (postacie dorosłe i niedojrzałe). ChPL: 30.08.2023 r.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: P.W. Vet-Agro Sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

FFDIN.U.06.2024.352



**Pupile pod Ochroną
to portal, z którego
nawet **psy i koty**
chciałyby korzystać!**



**Tutaj znajdziesz wszystkie
ważne pupilowe sprawy
– w jednym miejscu.**

Gdyby Twój zwierzęcy przyjaciel potrafił czytać
– to zdecydowanie byłaby jego ulubiona strona.

- pupilowe zagrożenia
- dieta i suplementacja
- behawioryzm
- zdrowie i opieka
- rasy i ciekawostki



**Wejdź do
pupilowego
świata!**

www.pupilepodochrona.pl

