



Pchły

Poradnik dla opiekuna psa i kota



Pupile pod
Ochroną



DROGI OPIEKUNIE!

Sam najlepiej wiesz, ile prawdziwej miłości możesz otrzymać od swojego pupila.

Szczęśliwy i zdrowy zwierzak z pewnością spędzi wiele pięknych i beztrudnych lat u Twojego boku. Aby to było możliwe, musisz działać – a my Ci w tym chętnie pomożemy!

Całoroczna profilaktyka przeciwko pchłom i kleszczom to podstawa dbania o zdrowie psa i kota. Chcemy przybliżyć Ci temat tych pasożytów oraz zagrożeń z nimi związanych.

W tej książeczce poruszymy temat **pcheł** – pasożytów, które są prawdziwą złączy psów i kotów.

No to w drogę!




PCHŁA – SKACZĄCY PROBLEM PUPILA



Pchły to małe owady krwiopijne, które są wtórnie bezskrzydłe. Oznacza to, że w trakcie ewolucji utraciły skrzydła, a więc również zdolność latania.

Pchły są bardzo uciążliwe dla pupila i stanowią zagrożenie dla jego zdrowia. Ukąszenia tego pasożyta są bolesne, powodują świąd i mogą być przyczyną szeregu chorób.


Niestety pozbycie się pcheł z otoczenia nie jest takie proste. Nie wystarczy codzienne odkurzanie i systematyczne pranie legowisk, jaja pcheł spadają z psa lub kota i ukrywają się w zakamarkach naszych mieszkań, dojrzewając i ponownie atakując.



JAK ATAKUJĄ PCHŁY?

Pchły można spotkać przez cały rok. Niedojrzałe formy przetrwają nawet kilka miesięcy, wyczekując swojej ofiary. W okresie jesienno-zimowym natężenie pcheł jest mniejsze, jednak wciąż pies lub kot może się nimi zarazić.

Pchły atakują poprzez wskoczenie na ofiarę, a następnie wbijają się w skórę aparatem klująco-ssącym i wysysają krew.



CHOROBY PRZENOSZONE PRZEZ PCHŁY

Pchła może przynieść wiele złego psim i kocim (a także ludzkim) organizmom. Ugryzienie tego pasożyta powoduje swędzenie, a w konsekwencji częste drapanie i gryzienie swojego ciała. Może to prowadzić do uszkodzenia skóry, grożącego zakażeniem. Dodatkowo ślina pchły ma działanie silnie uczulające.

Podrażnienia skóry
wywołujące silny
świąd

Niedokrwistość
u zwierząt silnie
zapchlonych

**Najczęstsze skutki
ukąszeń pcheł to:**

Bartonelloza – czyli
choroba kociego
pazura

Alergiczne pchle
zapalenie skóry
(APZS)



Uwaga, poprzez przypadkowe połknięcie pchły, nasz pupil może zarazić się tasiemcem – są one nosicielami pośrednimi jaj tego pasożyta.


CZY WIESZ, ŻE...

Tylko 5% pcheł znajduje się na zwierzęciu, a **95% przebywa w jego otoczeniu**, również w postaci jaj, larw i poczwarek.

Dorosła pchła może złożyć nawet **50 jaj dziennie** co daje niemal **700 jaj w okresie dwóch tygodni**, z których większość spada ze zwierzęcia. Postaci niedojrzałe pcheł (czyli jaja, larwy i poczwarki) gromadzą się wszędzie tam, gdzie pupil odpoczywa: w legowiskach, na dywanach, kanapach i innych podobnych miejscach.



Dlatego samo zabezpieczenie zwierzęcia odpowiednim preparatem nie wystarczy! Konieczne jest **zadbanie o czystość legowiska i całego mieszkania**.



JAK ROZPOZNAĆ, ŻE PUPIL JEST ZARAŻONY PCHŁAMI?

Zauważyłeś, że Twój pies lub kot ciągle się drapie i wygryza sierść najczęściej w okolicy ogona? Bardzo możliwe, że „złapał” pchły, które teraz uprzykrzają mu życie. Najprostszym sposobem, aby się upewnić, czy dokuczają mu te nieznosne pasożyty, jest test chusteczką.



Wyczesz psa grzebieniem, najlepiej takim o gęściej rozstawionych ząbkach, który będzie w stanie zebrać „grudki”, jeśli te występują w sierści zwierzęcia.



Położ chusteczkę na stole i strzep na nią zawartość grzebienia.



Spryskaj „grudki” na chusteczce wodą i zobacz czy zwilżony papier zabarwił się na czerwony kolor. Jeśli tak, oznacza to, że „grudki” są tak naprawdę odchodami pcheł.

KILKA FAKTÓW O PCHŁACH



PCHŁY SĄ SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNE DLA MALUCHÓW!

Duże zapchlenie, zwłaszcza szczeniąt i kociąt może prowadzić do anemii, a w rezultacie nawet do śmierci pupila.




PCHŁA PSIA LUB KOCIA MOŻE UGRYŹĆ CZŁOWIEKA

Chociaż człowiek nie jest ostatecznym żywicielem pchły i ta raczej nie zagości na naszym ciele zbyt długo, my również możemy paść ofiarą tego pasożyta, którego ukąszenia są dość bolesne.



PCHŁY ROZMNAŻAJĄ SIĘ BARDZO SZYBKO!

Jedna pchła w trakcie swojego życia może złożyć nawet 2000 jaj, które spadają ze zwierzęcia do otoczenia. Dlatego w zwalczaniu pcheł bardzo ważne jest nie tylko zabezpieczenie zwierzęcia, ale dokładne sprzątnięcie całego domu.



**Chcesz wiedzieć
więcej o pchłach?**



ZAPOBIEGAJ ZAMIAST LECZYĆ!

W ochronie pupila przed pasożytami zewnętrznymi bardzo ważna jest PROFILAKTYKA! Ochrona przed pchłami i kleszczami to wręcz obowiązek, aby zminimalizować ryzyko zarażenia niebezpiecznymi chorobami. W tym celu należy zastosować odpowiednie środki zwalczające pasożyty zewnętrzne.



Warto zabezpieczyć pupila przed pchłami i kleszczami od pierwszych tygodni życia! Większość preparatów można stosować u zwierząt już **od 8 tygodnia życia**.

PAMIĘTAJ!

Aby prawidłowo zadbać o swojego pupila, stosuj preparaty zgodnie z zapisami w ulotce. Odpowiednia częstotliwość aplikowania zapewni ciągłą ochronę przed pasożytami zewnętrznymi, nawet przez cały rok!



JAK CHRONIĆ PUPILA PRZED PCHŁAMI I KLESZCZAMI?

Istnieje wiele środków przeciwko pchłom i kleszczom dla psów i kotów, które należy stosować regularnie i przez cały rok, aby zapewnić zwierzakowi stałą ochronę. Zastosowanie odpowiedniego preparatu pozwoli uchronić naszych czworonożnych przyjaciół przed zagrożeniami przenoszonymi przez pchły.

Dodatkowo, zadbaj o miejsca, w których przebywa zwierzak – regularnie odkurzaj, pierz akcesoria pupila oraz stosuj środki owadobójcze.





FIPRex[®] DUO

Krople spot-on dla psów,
kotów i frotek



SPRAWDZONA OCHRONA PRZED PCHŁAMI I KLESZCZAMI!

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Szczegółowe informacje o lekach na: www.fiprex.pl

FIPREX DUO MA DODATKOWE DZIAŁANIE

– dojrzałych i niedojrzałych pcheł zwalczanie!



Fiprex DUO zabija dorosłe pchły i kleszcze, a także działa na wszystkie stadia rozwojowe pcheł: jaja, larwy i poczwarki, hamując ich rozwój. Dzięki temu zapewnia kompleksową ochronę przed tymi pasożytami i ogranicza ich ilość w otoczeniu.


DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ FIPREX DUO?



Ochrona przed pchłami i kleszczami sprawdzona przez miliony Polaków.



Łatwa aplikacja – nakrapianie na skórę raz w miesiącu.



Do stosowania zarówno u psów, kotów i fretek.



Dostępny w sklepach zoologicznych i lecznicach weterynaryjnych.

JAK DZIAŁAJĄ KROPLE FIPREX DUO?

Działanie kropli Fiprex DUO opiera się na dwóch substancjach czynnych:

Fipronil

– zwalcza inwazję pcheł, kleszczy i wszołtów. Jest to substancja o udowodnionej skuteczności bójczej przeciwko pchłom i kleszczom¹ oraz niskiej toksyczności w stosunku do ludzi i zwierząt.

(S)-Metopren

– hamuje rozwój niedojrzałych postaci rozwojowych pcheł: jaj, larw i poczwarek, prowadząc do ich śmierci i tym samym redukując ilość tych pasożytów w otoczeniu.

Fiprex DUO zwalcza wszystkie stadia rozwojowe pcheł: zarówno dojrzałe, jak i niedojrzałe postaci tych pasożytów. Działa na zwierzęciu, zanim jaja, larwy i poczwarki spadną z psa lub kota do otoczenia. Dzięki temu znacznie ogranicza liczbę pcheł w otoczeniu.

CZY FIPRONIL DZIAŁA NA KLESZCZE?

Tak! Najnowsze badania potwierdzają, że kleszcze (*Rhipicephalus sanguineus*) nie wykazują mechanizmu oporności przeciwko fipronilowi². Oznacza to, że produkty zawierające tę substancję, takie jak Fiprex i Fiprex DUO zwalczają kleszcze i dzięki temu minimalizują ryzyko zarażenia niebezpiecznymi chorobami.

1. Cole L.M., Nicholson R.A., Casida J.E.: Action of phenylpyrazole insecticides at the GABA-gated chloride channel. *Pestic Biochem Physiol.* 1993; 46 (1), 47–54.

2. Evidence of Permethrin Resistance and Fipronil Tolerance in *Rhipicephalus sanguineus* s.l. (Acari: Ixodidae) Populations From Florida and California. Yueyun Tian, Caitlin E. Taylor, Cynthia C. Lord, Phillip E.Kaufman. *J. Med. Entomol.* 2023 Mar; 60(2): 412–416.

WYBIERZ FIPREX DUO DLA SWOJEGO ZWIERZAKA



Fiprex® DUO

Blister o pojemności 0,5 ml
dla kotów i fretek



Fiprex® DUO S

Blister o pojemności 0,67 ml
dla psów o masie **od 2 do 10 kg**



Fiprex® DUO M

Blister o pojemności 1,34 ml
dla psów o masie **od 10 do 20 kg**



Fiprex® DUO L

Blister o pojemności 2,68 ml
dla psów o masie **od 20 do 40 kg**



Fiprex® DUO XL

Blister o pojemności 4,02 ml
dla psów o masie **powyżej 40 kg**

JAK STOSOWAĆ KROPLE FIPREX DUO?

1

Trzymaj pipetę pionowo, zbiornikiem z płynem do dołu. Stuknij w wąską część pipety, aby upewnić się, że zawartość pozostaje w głównym jej korpusie.

2

Odlam końcówkę.

3

Rozsuń sierść na grzbiecie zwierzęcia u podstawy szyi przed łopatkami, aż skóra będzie widoczna.

4

Umieść końcówkę pipety na skórze i ściśnij pipetę kilka razy, aby całkowicie opróżnić jej zawartość bezpośrednio na skórze w jednym miejscu.



PIES



KOT



FRETKA



APLIKUJ WYGODNIE CO 4 TYGODNIE!



PAMIĘTAJ!

Nie kąp psa lub kota 2 dni przed i 2 dni po podaniu produktu i częściej niż raz w tygodniu!

**POZNAJ
RÓWNIEŻ...**



FIPReX[®]

Krople spot-on i spray dla psów i kotów
przeciwko pchłom, kleszczom i wszom




Czy wiesz, że...

Produkty Fiprex zawierają największą ilość fipronilu w porównaniu do innych produktów tego typu³.

3. Dane na podstawie kart charakterystyki leków OTC w postaci spot-on i spray, zarejestrowanych w Polsce, zawierających w składzie fipronil.
Stan na dzień 21.05.2025 (<https://rejstry.ezdrowie.gov.pl/>).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Szczegółowe informacje o lekach na: www.fiprex.pl

JAK STOSOWAĆ KROPLE FIPREX SPOT-ON?



Odłam końcówkę tubki.



Rozchyl sierść na grzbiecie zwierzęcia u podstawy szyi przed łopatkami, aż skóra będzie widoczna.



Umieść końcówkę tubki na skórze i ściśnij ją, aby całkowicie opróżnić jej zawartość.



KOT



PIES DO 10 KG



PIES POWYŻEJ 10 KG



APLIKUJ WYGODNIE CO 4 TYGODNIE!



PAMIĘTAJ!

Nie kąp psa lub kota 2 dni przed i 2 dni po podaniu produktu!

JAK APLIKOWAĆ FIPREX SPRAY?

Butelka 100 ml

5 kg	od 15 do 30 psiknięć
10 kg	od 30 do 60 psiknięć
15 kg	od 45 do 90 psiknięć
20 kg	od 60 do 120 psiknięć
25 kg	od 75 do 150 psiknięć
30 kg	od 90 do 180 psiknięć

Butelka 250 ml

5 kg	od 5 do 10 psiknięć
10 kg	od 10 do 20 psiknięć
20 kg	od 20 do 40 psiknięć
30 kg	od 30 do 60 psiknięć
40 kg	od 40 do 80 psiknięć
50 kg	od 50 do 100 psiknięć



**PRZYPOMNIENIE
O ZAKRAPIANIU**



NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA



JAK POZBYĆ SIĘ PCHEŁ I KLESZCZY U PSA LUB KOTA?

Jeśli zaobserwujesz, że Twój zwierzak został zaatakowany przez pchły i kleszcze, zgłoś się po poradę do lekarza weterynarii, który wykona odpowiednie badania, aby wykluczyć zarażenie chorobami przenoszonymi przez te pasożyty. Warto również zastosować odpowiedni preparat przeciwko pchłom i kleszczom – **Fiprex lub Fiprex DUO w wersji dla kota lub psa** w odpowiednim rozmiarze, dopasowanym do wagi zwierzaka. Całoroczna profilaktyka minimalizuje ryzyko inwazji pcheł i kleszczy u domowych pupili i zarażenia niebezpiecznymi chorobami przenoszonymi przez te pasożyty.



DLACZEGO PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU WSKAZANA JEST KONSULTACJA Z LEKARZEM WETERYNARII?

Lekarz weterynarii jest specjalistą, jeśli chodzi o zdrowie zwierząt. Powinien on być dla właściciela psa lub kota **pierwszym i podstawowym źródłem informacji** przy wszelkich dolegliwościach i wątpliwościach, jeśli chodzi o zdrowie zwierzaka. Lekarz weterynarii doskonale zna i rozumie styl życia psa lub kota, stan jego zdrowia oraz środowisko i zasugeruje najbardziej odpowiedni produkt.



CZY MOGĘ ZASTOSOWAĆ FIPREX LUB FIPREX DUO U SZCZENIĄT I KOCIĄT?

Tak, Fiprex dla psów i kotów oraz Fiprex DUO dla psów, kotów i fretek **można stosować u szceniąt i kociąt** pod warunkiem, że nie znajdują się już przy matce, która wyliże preparat podczas mycia młodych. Produkty z linii Fiprex można stosować u szceniąt powyżej 8 tygodnia życia i/lub ważących więcej niż 2 kg oraz u kociąt powyżej 8 tygodnia życia i/lub ważących więcej niż 1 kg, a Fiprex DUO również u fretek od 6 miesiąca życia. Jeśli masz wątpliwości dotyczące leku oraz wyboru dawki – skontaktuj się z lekarzem weterynarii, który pomoże Ci dobrać preparat dostosowany do potrzeb pupila.



JAKI PRODUKT NALEŻY WYBRAĆ, JEŚLI POSIADAM PSA I KOTA?

Psy i koty mieszkające pod jednym dachem powinny być zabezpieczane przed pchłami i kleszczami, nawet jeśli jedno z nich nie wychodzi na spacer. Warto zwrócić uwagę na odpowiedni dobór środków przeciwpasożytniczych. Niektóre preparaty dla psów zawierają substancję czynną – **permetrynę, która jest silnie trująca dla kotów**. Zastosowanie takiego preparatu może być niebezpieczne dla zdrowia i życia mruczka. Odpowiednim wyborem zarówno dla psów, jak i dla kotów będzie Fiprex lub Fiprex DUO w wariantcie dopasowanym do wagi zwierzęcia. Krople te zawierają fipronil (Fiprex) oraz fipronil i (S)-metopren (Fiprex DUO), substancje, które można stosować zarówno u psów, jak i u kotów, a także u fretek.



KĄPIĘ MOJE PSY I KOTY REGULARNIE I DOŚĆ CZĘSTO. JAK SZYBKO PO APLIKACJI FIPREX I FIPREX DUO MOŻNA KĄPAĆ ZWIERZĘTA BEZ RYZYKA USUNIĘCIA PREPARATU?

Kąpiel z szamponem po zastosowaniu preparatu może spowodować wypłukanie substancji aktywnej i konieczność ponownego użycia kropli Fiprex lub Fiprex DUO. Zasadniczo **nie powinno się kąpać zwierzęcia 2 dni przed i 2 dni po aplikacji preparatu i częściej niż raz w tygodniu**. Badania wykazały, że mycie szamponem z chlorheksydyną nie wpływa negatywnie na jakość i długość ochrony. Skontaktuj się z lekarzem weterynarii, który wyjaśni szczegółowo mechanizm działania substancji czynnych i warunki aplikacji, aby Twój pupil był pod nieustanną ochroną.

**DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O PRODUKTACH FIPREX!**



NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Fiprex KOT, 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów; Fiprex S, 75 mg/ml; Fiprex M, 150 mg/2 ml; Fiprex L, 300 mg/4 ml; Fiprex XL, 412,5 mg/5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów; Fiprex Spray, 0,5 g/100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów. **SUBSTANCJA CZYNNNA:** Fipronil; Fiprex KOT: 52,5 mg/0,7 ml; Fiprex S: 75 mg/1 ml; Fiprex M: 150 mg/2 ml; Fiprex L: 300 mg/4 ml; Fiprex XL: 412,5 mg/5,5 ml; Fiprex Spray: 0,5 g/100 ml. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Fiprex KOT, Fiprex S, Fiprex M, Fiprex L, Fiprex XL: Roztwór do nakrapiania. Roztwór o barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej; Fiprex Spray: Roztwór na skórę, roztwór o barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej. **WSKAZANIA:** Zwalczanie inwazji pcheł (*Ctenocephalides* spp.), kleszczy (*Ixodes* spp.) i wszy (*Linognathus* spp.) u psów i kotów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni. Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), po uprzednim postawieniu diagnozy przez lekarza weterynarii. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:** P.W. Vet-Agro Sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin. ChPL: Fiprex KOT: 10.05.2024 r.; Fiprex S, Fiprex L, Fiprex XL: 03.04.2024 r.; Fiprex M: 05.04.2024 r.; Fiprex Spray: 28.10.2023 r.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Fiprex DUO 50 mg + 60 mg roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek. **SUBSTANCJA CZYNNNA:** Każda 0,5 ml pipetka zawiera: substancje czynne: Fipronil 50,00 mg, (S)-Metopren 60,00 mg. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Roztwór do nakrapiania. Klarowny zielonkawo-żółty roztwór. **WSKAZANIA:** U kotów: Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i (lub) wszołami. Eliminacja pcheł (*Ctenocephalides* spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 6 tygodni po zabiegu. Eliminacja kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Działanie roztoczebne produktu utrzymuje się do 2 tygodni po podaniu (jak wykazały dane doświadczalne). Eliminacja wszołów (*Felicola subrostratus*). Produkt może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), o ile zostało ono wcześniej rozpoznane przez lekarza weterynarii. U fretek: Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami. Eliminacja pcheł (*Ctenocephalides* spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Eliminacja kleszczy (*Ixodes ricinus*). Działanie roztoczebne produktu utrzymuje się przez 4 tygodnie po podaniu (jak wykazały dane doświadczalne). ChPL: 08.01.2022 r.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Fiprex DUO S 67 mg + 60,3 mg; Fiprex DUO M 134 mg + 120,6 mg; Fiprex DUO L 268 mg + 241,2 mg; Fiprex DUO XL 402 mg + 361,8 mg, roztwór do nakrapiania dla psów. **SUBSTANCJA CZYNNNA:** Fiprex DUO S – Każda 0,67 ml pipetka zawiera: substancje czynne: Fipronil 67,00 mg, (S)-Metopren 60,30 mg; Fiprex DUO M – Każda 1,34 ml pipetka zawiera: substancje czynne: Fipronil 134,00 mg, (S)-Metopren 120,60 mg; Fiprex DUO L – Każda 2,68 ml pipetka zawiera: substancje czynne: Fipronil 268,00 mg, (S)-Metopren 241,20 mg; Fiprex DUO XL – Każda 4,02 ml pipetka zawiera: substancje czynne: Fipronil 402,00 mg, (S)-Metopren 361,80 mg. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Roztwór do nakrapiania. Klarowny zielonkawo-żółty roztwór. **WSKAZANIA:** Produkt jest przeznaczony Fiprex DUO S: dla psów o masie od 2 do 10 kg; Fiprex DUO M: dla psów o masie od 10 do 20 kg; Fiprex DUO L: dla psów o masie od 20 do 40 kg; Fiprex DUO XL: dla psów o masie powyżej 40 kg; Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i (lub) wszołami. Leczenie inwazji pcheł (*Ctenocephalides* spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 8 tygodni. Produkt zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwerek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 8 tygodni po zabiegu. Leczenie inwazji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Działanie roztoczebne produktu utrzymuje się do 4 tygodni po podaniu. Leczenie inwazji wszołów (*Trichodectes canis*). Produkt może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), o ile zostało ono wcześniej rozpoznane przez lekarza weterynarii. ChPL: Fiprex DUO S: 01.04.2021 r.; Fiprex DUO M, Fiprex DUO L, Fiprex DUO XL: 02.04.2021 r.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: P.W. Vet-Agro Sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

FFD.U.09.2024.394



**Poznaj fascynujący
świat psów i kotów
razem z Pupilami
pod Ochroną!**



Zobacz więcej na:
www.pupilepodochrona.pl

